

GILIO MARISA - DANTE MERIGHI - FLAVIO POSANTI

ELENCO SISTEMATICO DI ALCUNI  
BASIDIO - ASCO - MIXO MICETI  
FINORA RINVENUTI NEL TERRITORIO DI ROVERETO  
E DINTORNI (TRENTINO MERIDIONALE)

I<sup>a</sup> PARTE

**Abstract** - GILIO MARISA - DANTE MERIGHI - FLAVIO POSANTI - Systematic list of some Basidio - Asco - Myxo - mycetes, so far found in the territory of Rovereto and surroundings (Southern Trentino).

The Authors report a list of fungi found in the territory of Rovereto and its surroundings, with reference to a similar paper by R. Cobelli edited a hundred years ago by the Museo Civico of Rovereto. The future prospects of this study are also described.

**Key words:** Basidio - Asco - Myxo - mycetes, Systematic list.

**Riassunto** - GILIO MARISA - DANTE MERIGHI - FLAVIO POSANTI - Gli Autori riportano un elenco di funghi rinvenuti nella zona di Rovereto e dintorni, prendendo spunto da un'analogia pubblicazione di R. Cobelli, uscita cento anni or sono per cura del Museo Civico di Rovereto. Si illustrano inoltre le prospettive future dello studio così avviato.

**Parole chiave:** Basidio - Asco - Mixo - miceti, Elenco sistematico.

PREMESSA

Nel 1885, Ruggero de Cobelli (<sup>1</sup>) pubblicava, per cura del Museo Civico di Rovereto, un «Elenco sistematico degli Imeno-Disco-Gasteromiceti e Tuberacei finora trovati nella Valle Lagarina», che faceva seguito ad una prima lista di funghi pubblicata su Michelia nel 1880; ulteriori aggiornamenti sono contenuti in un successivo

---

(<sup>1</sup>) Ruggero de Cobelli (Rovereto, 1838-1921) fu medico e naturalista, attento ed eclettico studioso della flora e fauna roveretana. Autore di numerose pubblicazioni, tra cui le più significative sono quelle a carattere entomologico (G. Cobelli 1931), ebbe ricche relazioni epistolari con alcuni tra i più importanti naturalisti del suo tempo.

contributo (Cobelli, 1891). Questi cataloghi sono, pur con tutti i loro limiti sui quali si discuterà più avanti, gli unici documenti scritti finora dedicati specificamente alla micoflora di Rovereto e dintorni (anche se riferimenti alla zona si trovano in altri lavori di studiosi che operarono nel Trentino, per una rassegna dettagliata dei quali si veda Dalla Torre e Sarnthein, 1900 e 1905).

Da qui l'esigenza di una revisione critica, che trova attuazione, almeno parziale, in questo elenco di funghi, redatto principalmente da G. Marisa e D. Merighi, ambedue membri del Gruppo Micologico «G. Barbacovi» di Rovereto e studiosi della micoflora lagarina da oltre vent'anni.

L'intento non è solo quello di colmare, attraverso questo e successivi contributi, un vuoto sulla conoscenza delle specie tallificanti nel territorio lagarino, ma è anche quello di proporre, dove è fattibile, delle indagini ambientali comparative per una migliore conoscenza del mondo naturale che ci circonda.

Infatti lo stretto legame tra Gruppo Micologico «G. Barbacovi» e la Sezione Archeologia, Storia e Scienze naturali dei Musei Civici di Rovereto, si situa nell'ottica del Museo come centro coordinatore, di conservazione e di elaborazione, al quale possono convergere dati e materiali provenienti da tutti i gruppi esterni che operano scientificamente sul territorio. Risultato di tale collaborazione è stato finora l'allestimento del nucleo iniziale della micoteca (che conta già d'ora alcune centinaia di *exsiccata*) e la redazione di questo primo contributo, che si pone come premessa per un ulteriore e sempre più articolato studio della micoflora di Rovereto e delle zone limitrofe.


## CARATTERI E LIMITI DELL'ELENCO

L'area considerata nel lavoro è, a grandi linee, sovrapponibile a quella delineata da Ruggero Cobelli (Cobelli, 1885) ed è circoscritta da confini ideali così definiti: spartiacque Stivo-Cornetto di Bondone; Polsa; spartiacque del Monte Zugna; monte Finonchio; Cimana (si veda la cartina allegata).

Le segnalazioni sono basate su note degli autori, raccolte attraverso ricerche di campo ed altre particolari occasioni (mostre micologiche, partecipazione a comitati scientifici etc.) e riferite alle sole specie per le quali la determinazione abbia carattere di univocità.

L'elenco non è esente da limiti che, se costituiscono un parziale ostacolo verso l'esaurività del lavoro, non possono che essere considerati ulteriori stimoli per una futura attività di ricerca e di controllo.

Come si vedrà dalle località di raccolta riportate nella lista, alcune zone hanno ricevuto meno attenzioni di altre; è quindi probabile che esse rivelino, ad uno studio più approfondito, ulteriori ed importanti aree di segnalazione. Infine, solo alcune tra le specie riportate sono conservate nella micoteca; il lavoro del Gruppo Micologico e del Museo Civico, in questa direzione, garantisce tuttavia una continua crescita del materiale essiccato.



## LEGENDA

- |                |                    |                       |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| 1 Val di Cei   | 8 Polsa            | 15 Cengio Alto        |
| 2 Cimana       | 9 Monte Zugna      | 16 Castel Pradaglia   |
| 3 Bordala      | 10 Zugna Torta     | 17 Val Scodella       |
| 4 Bordala Alta | 11 Lavini di Marco | 18 Vallunga           |
| 5 Monte Biaena | 12 Albaredo        | 19 Montagna di Volano |
| 6 Faé          | 13 Costa Violina   | 20 Moietto            |
| 7 Bordina      | 14 Grottole        | 21 Monte Finonchio    |

Gli autori si sono resi conto che un confronto con il lavoro di Cobelli era improponibile, a causa di alcuni tratti precipui della vecchia pubblicazione. Mancano innanzitutto quei caratteri che possono dare una connotazione precisa alla singola segnalazione (habitat, località di raccolta, frequenza, diffusione) anche se, nella premessa, Cobelli dichiara di possedere tra i suoi appunti personali tutti quei dati che sarebbero necessari per una valutazione critica del lavoro (e che, purtroppo, non sono finora stati ritrovati). A questo si aggiunge la completa mancanza di materiale essiccato sul quale potere, in alternativa, verificare le segnalazioni. Ultima, ma non per importanza, vi è la difficoltà di adattare alcuni binomi e talune collocazioni sistematiche con i dettami della nomenclatura moderna, difficoltà che ha talvolta costretto gli autori ad un lavoro improbo e non definitivo.

Da tutto ciò è evidente come un confronto diretto, a distanza di cent'anni, possa avere poco più che un valore indicativo: alcune specie trovate dal Cobelli non sono finora state rinvenute mentre, per contro, gli autori riportano numerose specie non segnalate dal Cobelli. Vista la difficoltà nell'analizzare le possibili cause di questo divario, il presente lavoro va inteso soprattutto come contributo preliminare allo studio della micoflora lagarina e come base di partenza per ulteriori approfondimenti, tra i quali è doveroso citare alcuni progetti già in fase di attuazione.

1. La raccolta di *exsiccata*, che dovrebbe procedere celermente fino a coprire almeno gran parte della flora fungina tallificante sul territorio di Rovereto e dintorni.
2. La continuazione del censimento iniziato con questo elenco, con la possibilità di stilare una cartografia territoriale della micoflora.
3. Elaborazione con il computer dei dati inerenti sia gli *exsiccata* che il censimento micologico, lavoro che apre prospettive metodologiche interessanti e nuovi spazi operativi.

Per motivi di spazio in questa prima parte dell'elenco vengono presentati solo gli ordini *Aphyllophorales* e *Boletales* e ci riserviamo in un secondo e terzo contributo di completare l'elenco sistematico.

L'elencazione sistematica è stata condotta, nell'ordine, attraverso i seguenti *taxa*: classe, ordine, famiglia, genere, specie e, in alcuni casi, sottospecie.

Nella nomenclatura e nella sequenza di compilazione ci si è riferiti a Moser (1978), per gli ordini, *Boletales*, *Agaricales* e *Russulales*; a Jülich (1984), per gli ordini *Aphyllophorales*, *Gasteromycetales* e *Heterobasidiomycetales*; a Dennis (1978), per la classe *Ascomyctetes*; a Martin e Alexopoulos (1969), per la classe *Myxomycetes*.

Per ogni specie sono riportati:

- Il Comune, la località di raccolta ed, in alcuni casi tra parentesi, la zona ristretta all'interno della località, soprattutto per specie rare o poco diffuse..
- L'habitat, il substrato di crescita e le eventuali associazioni vegetali.
- La diffusione, con le seguenti abbreviazioni: PD = poco diffuso; D = diffuso, DD = molto diffuso.

La frequenza, con le seguenti abbreviazioni: R = rara; NF = non frequente; F = frequente; C = comune.

Per le specie con notevole diffusione, vengono spesso omesse le località di raccolta e le note di frequenza si intendono estese a tutto il territorio.

- Il numero d'inventario dell'*exsiccatum*, se nella micoteca del Museo Civico esiste un esemplare della specie in questione.

#### ELENCO SISTEMATICO

CLASSE: Basidiomycetes

ORDO: Aphyllophorales

FAMILIA: Cantharellaceae Schroet. 1888

GENUS: *Cantharellus* Adans. ex Fr. 1821

- *C. cibarius* Fr.  
D ; F
  - *C. cibarius* var. *amethystea* Quél.  
D; NF
  - *C. cinereus* Pers. ex Fr.  
Rovereto, Vallunga - Val Scodella;  
bosco misto; NF;  
ex. n. 155
  - *C. friesii* Quél.  
Villalagarina, Cei;  
sotto *Fagus sylvatica*; NF
  - *C. lutescens* (Pers.) ex Fr.  
nei boschi; D; C
  - *C. melanoxeros* Desm.  
Brentonico, Saccone;  
sotto *Corylus avellana*; R
  - *C. tubaeformis* Fr.  
nei boschi, specialmente in montagna; D; F
- GENUS: *Craterellus* Pers. 1825
- *C. cornucopoides* (L.) ex Pers.  
nei boschi; D; F
- GENUS: *Pseudocraterellus* Corner 1957
- *P. sinuosus* (Fr.) Reid  
Rovereto, Vallunga; Isera, Lenzima (Castel Corno);  
bosco misto; NF  
ex. n. 156

FAMILIA: Clavariaceae Chev. 1826

GENUS: *Clavaria* Fr. 1821

- *C. fumosa* Fr.  
Rovereto, Vallunga;  
bosco misto; R
- *C. rosea* Fr.  
Rovereto, Val Scodella;  
sotto latifoglie; R
- *C. vermicularis* Sw. ex Fr.  
Rovereto, Vallunga;  
bosco misto; R

GENUS: *Clavariadelphus* Donk 1933

- *C. ligula* (Schaeff. ex Fr.) Donk  
Rovereto, Vallunga;  
bosco misto; F
- *C. pistillaris* (Fr.) Donk  
D; F
- *C. truncatus* (Quél) Donk  
D; F

GENUS: *Clavulinopsis* van Overeem 1923

- *C. corniculata* (Fr.) Corner  
Rovereto, Vallunga;  
bosco misto; F
- *C. helvola* (Fr.) Corner  
Rovereto, Vallunga;  
fra l'erba in bosco misto; NF

GENUS: *Macrotyphula* Petersen 1972

- *M. fistulosa* (Fr.) Petersen  
Rovereto, Vallunga;  
bosco misto; R
- *M. juncea* (Fr.) Berthier  
Rovereto, Vallunga;  
su foglie di *Quercus* sp.; R

FAMILIA: Clavulinaceae (Donk) Donk 1961

GENUS: *Clavulina* Schroet. 1888

- *C. cinerea* (Fr.) Schroet.  
D; C

— *C. cristata* (Fr.) Schroet.

D; C

— *C. rugosa* (Fr.) Schroet.

D; F

FAMILIA: Sparassidaceae Herter 1910

GENUS: *Sparassis* Fr. ex Fr. 1821

- *Sp. crispa* (Wulf.) ex Fr.  
Rovereto, Vallunga;  
su ceppo marcescente di *Pinus* sp.; R

FAMILIA: Pterulaceae Corner 1970

GENUS *Pterula* Fr. 1825

- *P. multifida* E.P. Fries ex Fr.  
Rovereto, Val Scodella; Villalagarina, Cei;  
nel bosco; NF  
ex. n. 178

FAMILIA: Gomphaceae Donk 1961

GENUS: *Gomphus* Pers. ex S.F. Gray 1821

- *G. clavatus* (Pers. ex Fr.) S.F. Gray;  
Ronzo-Chienis, Bordala alta;  
nel bosco; NF

FAMILIA: Ramariaceae Corner 1970

GENUS: *Ramaria* Holmskj ex S.F. Gray 1821

- *R. abietina* (Pers. ex Fr.) Quél.  
Rovereto, Val Scodella;  
sotto *Pinus* sp.; NF;  
Ronzo-Chienis, Bordala Alta;  
sotto *Picea abies*; NF
- *R. botrytis* (Fr.) Ri.  
nel bosco; D; NF
- *R. flava* (Schaeff. ex Fr.) Quél.  
D; F

- *R. pallida* (Schaeff. ex Schulz.) Ri.  
D; C
- *R. sanguinea* (Pers. ex Secr.) Quél.  
Villalagarina, Cei, Ronzo-Chienis, Bordala Alta;  
D; F

FAMILIA: Hydnaceae Chev. 1826 (s. str.)

GENUS: *Hydnus* L. ex Fr. 1821

- *H. repandum* L. ex Fr.  
D; F
- *H. rufescens* Fr.  
D; F

FAMILIA: Auriscalpiaceae Maas G. 1963

GENUS: *Auriscalpium* S.F. Gray 1821

- *A. vulgare* S.F. Gray  
su strobili di *Pinus* sp.; NF

FAMILIA: Hericaceae Donk 1964

GENUS: *Creolophus* P. Karst. 1879

- *C. cirrhatus* (Pers. ex Fr.) P. Karst.  
Brentonico; R

GENUS: *Hericium* Pers. ex S.F. Gray 1821

- *H. clathroides* (Pallas ex Fr.) Pers.  
Rovereto città;  
su pianta viva di *Sophora japonica*; R  
ex. n. 148

FAMILIA: Corticiaceae s. lat.

GENUS: *Aleurodiscus* Rabenh ex Schroet. in Cohn 1888 (nom. cons.)

- *A. disciformis* (D.C. ex Fr.) Pat.  
Isara, Bordala;  
su *Quercus* sp. e *Fagus sylvatica*; NF

GENUS: *Corticium* Pers. 1794

- *C. roseum* Pers.  
Rovereto, Val Scodella;  
su palo di steccato; NF

GENUS: *Vuilleminia* Maire 1902

- *V. comedens* (Nees ex Fr.) Maire  
decorticante, su rami eretti  
di latifoglie morte; DD; C  
ex. n. 196

GENUS: *Merulius* Fr. 1821

- *M. tremellosus* Fr.  
Villalagarina, Cei  
su di un ceppo; NF

GENUS: *Chondrostereum* Pouz. 1959

- *Ch. purpureum* (Pers. ex Fr.) Pouz.  
su tronchi e ceppi; N F

GENUS: *Plicaturopsis* Reid 1964

- *P. crispa* (Pers. ex Fr.) Reid  
Villalagarina, Cei;  
su ramo di latifoglia; N F

GENUS: *Steccherinum* S.F. Gray 1821

- *S. ochraceum* (Pers. in Gmelin ex Fr.) S.F. Gray  
Rovereto, Vallunga;  
su corteccia di *Laburnum anagyroides*; N F

GENUS: *Scytinostroma* Donk 1956

- *S. portentosum* (Berk. & Curt. in Berk.) Donk  
su ramo di latifoglia; N F

GENUS: *Lopharia* Kalchbr. & Mac Owan in Kalchbr. 1881

- *L. spadicea* (Pers. ex Fr.) Boidin  
su pali e tronchi di latifoglie (*Juglans* Sp.) N F  
ex. n. 64

GENUS: *Peniophora* Cke. 1879

- *P. cinerea* (Pers. ex Fr.) Cke.  
su legno morto di varie latifoglie; D; F
- *P. laeta* (Fr.) Donk  
Rovereto, Val Scodella;  
su ramo morto di *Carpinus betulus*; N F

- *P. quercina* (Pers. ex Fr.) Cke.  
Rovereto, Val Scodella (Grottola);  
su rami morti (eretti) di *Quercus pubescens*; N F  
ex. n. 65 et n. 243 X

GENUS: *Stereum* Pers. ex S. F. Gray 1821

- *S. hirsutum* (Willd. ex Fr.) S.F. Gray  
su legni morti di latifoglie; D D; C  
ex. n. 22
- *S. rugosum* (Pers. ex Fr.) Fr.  
sulla corteccia di latifoglie morte; D; F  
ex. n. 32
- *S. sanguinolentum* (Alb. & Schw. ex Fr.) Fr.  
sulla corteccia di aghifoglie morte; D; NF  
ex. n. 221

GENUS: *Merulioopsis* Bond. in Parm. 1959

- *M. corium* (Fr.) Ginns  
Rovereto, Val Scodella;  
su ramo morto di latifoglia; N F

FAMILIA: Coniophoraceae Ulbr. 1928

GENUS: *Coniophora* D.C. ex Merat 1821

- *C. arida* (Fr.) P. Karst.  
Rovereto, Lavini - Val Scodella;  
su tronco morto di *Pinus nigra*; N F  
ex. n. 51
- *C. puteana* (Schum ex Fr.) P. Karst.  
Rovereto, Giardini Milano - Vallunga;  
su tronco morto di *Cedrus* Sp. e su ceppo di *Pinus* Sp.; N F  
ex. n. 238

FAMILIA: Thelephoraceae Chev. 1826

GENUS: *Thelephora* Fr. 1821

- *T. palmata* (Scop.) ex Fr.  
Rovereto, Monte Zugna;  
adiacente a radici superficiali; D; NF

GENUS: *Hydnellum* P. Karst. 1879

- *H. aurantiacum* (Batsch ex Fr.) P. Karst.  
Isera, Bordala;  
sotto *Fagus sylvatica*; N F
- *H. ferrugineum* (Fr. ex Fr.) P. Karst.  
Villalagarina, Cei;  
bosco misto; N F
- *H. peckii* Banker apud Pck.  
Ronzo-Chienis, Monte Biaena; N F
- *H. spongiosipes* (Peck) Pouz.  
Isera, Bordala;  
sotto *Fagus sylvatica*; N F

GENUS: *Sarcodon* P. Karst. 1881

- *S. imbricatus* (L. ex Fr.) P. Karst.  
specialmente in montagna; D; F

GENUS: *Bankera* Coker & Beers ex Pouz. 1955

- *B. violascens* (Alb. & Schw. ex Fr.) Pouz.  
Villalagarina, Cei;  
bosco misto; R

GENUS: *Phellodon* P. Karst. 1881

- *P. niger* (Fr. ex Fr.) P. Karst  
D; N F
- *P. tomentosus* (L. ex Fr.) Banker  
D; NF

FAMILIA: Hymenochaetaceae Donk 1948

GENUS: *Hymenochaete* Lév. 1846

- *H. rubiginosa* (Dicks. ex Fr.) Lév.  
su ceppi e rami morti di latifoglie; D; NF  
ex. n. 37

GENUS: *Coltricia* S.F. Gray 1821

- *C. perennis* (L. ex Fr.) Murr.  
Rovereto, Vallunga;  
su sentieri e terreni bruciati; D; NF  
ex. n. 67

GENUS: *Inonotus* P. Karst. 1880

- *I. hispidus* (Bull. ex Fr.) P. Karst.  
Rovereto, città;  
su piante vive di latifoglie; F  
ex. n. 186 X

GENUS: *Phellinus* Quél. 1886

- *Ph. laevigatus* (Fr.) Bourd. & Galz.  
Rovereto, Zugna Torta (Malga Tof);  
su tronchetto morto di *Betula* sp.; R  
ex. n. 216
- *Ph. ignarius* (L. ex Fr.) Quél.  
Isera, Bordala;  
su *Salix* sp.; N F
- *Ph. punctatus* (Fr.) Pil.  
Rovereto, città;  
su *Corylus avellana* e *Robinia pseudoacacia*; F  
ex. n. 216
- *Ph. ribis* (Schum. ex Fr.) P. Karst.  
Rovereto, Lavini;  
su *Euonymus europaeus*; R

FAMILIA: *Ganodermataceae* Donk 1948

GENUS: *Ganoderma* P. Karst. 1881

- *G. adpersum* (Schulzer) Donk  
Rovereto, Giardini Milano;  
alla base di una latifoglia viva; N F
- *G. appianatum* (Pers.) Pat.  
Rovereto, Giardini Milano;  
su latifoglia; N F
- *G. lucidum* (Fr.) P. Karst.  
Rovereto, Vallunga;  
alla base di ceppi di latifoglie; N F

FAMILIA: *Polyporaceae* s. lat.

GENUS: *Polyborus* Mich. ex Fr. 1821

- *P. badius* (Pers. ex S.F. Gray) Schw.  
Brentonico, Crosano;  
su tronco di *Salix* sp.; R

- *P. ciliatus* (Fr.) ex Fr.  
su latifoglie; D; F
- *P. melanopus* (Pers.) ex Fr.  
alla base di ceppi e su radici di latifoglie; N F
- *P. mori* (Pollini) ex Fr.  
Trambileno, Porte;  
su tronchi di *Morus* sp. e *Wistaria sinensis*; N F  
ex. n. 61
- *P. squamosus* (Huds.) ex Fr.  
su ceppi di latifoglie; D; F  
ex. n. 17 et n. 232
- *P. tuberaster* (Pers.) ex Fr.  
Villalagarina, Cei;  
su rami di latifoglie; N F;  
ex. n. 29
- *P. varius* (Pers.) ex Fr.  
su legno di *Fagus sylvatica*; D; F  
ex. n. 40 et n. 254

GENUS: *Piptoporus* P. Karst. 1881

- *P. betulinus* (Bull. ex Fr.) P. Karst.  
su tronchi di *Betula* sp.; D; F

GENUS: *Laeitiporus* Murr. 1904

- *L. sulphureus* (Bull. ex Fr.) Murr.  
Rovereto, città;  
su tronco di *Prunus avium* vivo; R

GENUS: *Meripilus* P. Karst. 1882

- *M. giganteus* (Pers. ex Fr.) P. Karst.  
Villalagarina, Cei; Brentonico, Polsa;  
alla base di latifoglie; R

GENUS: *Abortiporus* Murr. 1904

- *A. biennis* (Bull. ex Fr.) Sing.  
Rovereto, Vallunga;  
attorno ad un ceppo; R  
ex. n. 49

GENUS: *Phaeolus* Pat. 1900

- *Pb. schweinitzii* (Fr.) Pat.  
Villalagarina, Cei;  
bosco misto: N F

GENUS: *Hapalopilus* P. Karst. 1881

- *H. rutilans* (Pers. ex Fr.) P. Karst.  
Villalagarina, Cei;  
su ramo di *Fagus sylvatica*; R

GENUS: *Osteina* Donk 1966

- *O. obducta* (Berk.) Donk  
Isera, Bordala;  
su ceppo di *Larix decidua*; N F

GENUS: *Postia* Fr. 1874

- *P. caesia* (Schrad. ex Fr.) P. Karst.  
su tronco di *Prunus avium*; N F
- *P. stiptica* (Pers. ex Fr.) Jülich  
Isera, Bordala;  
su ceppo di *Picea abies*; N F

GENUS: *Bjerkandera* P. Karst. 1879

- *B. adusta* (Willd. ex Fr.) P. Karst.  
su diverse latifoglie; D; F  
ex. n. 63

GENUS: *Schizopora* Vel. 1922

- *Sch. carneo-lutea* (Rodw. & Clel.) Klotl. & Pouz.  
Rovereto, Val Scodella;  
su latifoglia; R
- *Sch. paradoxa* (Schrad. ex Fr.) Donk  
Rovereto, Val Scodella;  
su rami morti di *Carpinus betulus*; N F

GENUS: *Antrodia* P. Karst. 1879

- *A. xantha* (Fr. ex Fr.) Ryv.  
Villalagarina, Cei;  
su di un ceppo; N F

GENUS: *Cerrena* S.F. Gray 1821

- *C. unicolor* (Bull. ex Fr.) Murr.  
su ceppi di varie latifoglie; D; F

GENUS: *Datronia* Donk 1966

- *D. mollis* (Sommerf. ex Fr.) Donk  
Rovereto, Moietto;  
su ceppo di *Fagus sylvatica*; R  
ex. n. 197

GENUS: *Dichomitus* D.A. Reid 1965

- *D. campestris* (Quél.) Dom. & Orl.  
Brentonico, Crosano; Rovereto, Grottole; Isera, Lenzima (Castel Corno);  
su rami morti di *Corylus avellana*; R  
ex. n. 236

GENUS: *Funalia* Pat. 1900

- *P. trogii* (Berk. in Trog.) Bond. & Sing.  
Rovereto, Marco;  
su tronco morto di *Populus* sp.; N F

GENUS: *Lenzites* Fr. 1835

- *L. betulina* (L. ex Fr.) Fr.  
su ceppi di latifoglia; D; N F  
ex. n. 56

GENUS: *Pycnoporus* P. Karst. 1881

- *P. cinnabarinus* (Jacq. ex Fr.) P. Karst.  
su rami di latifoglie morte; D; C  
ex. n. 38

GENUS: *Trametes* Fr. 1836

- *T. hirsuta* (Wulf. ex Fr.) Pil.  
Trambileno, Val Scodella; Isera, Bordala;  
su legna tagliata di *Ostrya carpinifolia* e *Quercus pubescens*; R  
ex. n. 36 et n. 242 X
- *T. multicolor* (Schaeff.) Jülich  
Rovereto, Zugna Torta (Malga Tof);  
su *Populus tremula*; N F  
ex. n. 219
- *T. pubescens* (Schum. ex Fr.) Pil.  
Villalagarina, Cei;  
su ceppo; N F
- *T. suaveolens* (Fr.) Fr.  
Brentonico, Crosano (Pont del Diaol); Rovereto, Navicello;  
su pianta viva di *Salix* sp.; N F  
ex. n. 229 X
- *T. versicolor* (L. ex Fr.) Pil.  
DD; C  
ex. n. 39

GENUS: *Trichaptum* Murr. 1904

- *T. abietinum* (Pers. ex Fr.) Ryv.  
su rami e tronchi di aghifoglie; D; C

GENUS: *Daedaleopsis* Schroet. 1888

- *D. confragosa* (Bolt. ex Fr.) Schroet.  
su diverse latifoglie; D; F  
ex. n. 59
- *D. tricolor* (Bull.) Bond.  
su diverse latifoglie; D; N F  
ex. n. 62

GENUS: *Fomes* (Fr.) Fr. 1849

- *F. fomentarius* (L; ex Fr.) Fr.  
Rovereto, città;  
su ceppo di *Aesculus hippocastanum*; R

GENUS: *Fomitopsis* P. Karst. 1881

- *F. pinicola* (Sw. ex Fr.) P. Karst.  
in montagna su aghifoglie; D; F

GENUS: *Gloeophyllum* (P. Karst.) P. Karst. 1882

- *G. abietinum* (Bull. ex Fr.) P. Karst.  
Rovereto, città;  
su travi lasciate all'aperto; N F
- *G. odoratum* (Wulf. ex Fr.) Imaz.  
su ceppi di aghifoglie in montagna; D; C
- *G. sepiarium* (Wulf. ex Fr.) P. Karst.  
su aghifoglia; D; N F  
ex. n. 240
- *G. trabeum* (Pers. ex Fr.) Murr.  
Rovereto, Vallunga;  
su una tavola per terra; R

GENUS: *Heterobasidion* Bref. 1888

- *H. annosum* (Fr.) Bref.  
Isera, Bordala;  
alla base di un ceppo di *Picea abies*; N F

GENUS: *Pleurotus* (Fr.) Quél.

- *P. dryinus* (Pers. ex Fr.) Kummer  
Rovereto, Lizzana;  
su pianta di *Sophora japonica*; N F  
ex. n. 190
- *P. ostreatus* (Jacq. ex Fr.) Kummer  
Villalagarina, Molini;  
su ceppo di *Celtis australis*; N F

GENUS: *Panus* Fr.

- *P. conchatus* (Bull. ex Fr.) Fr.  
Isera, Bordala; Villalagarina, Cei - Castellano (Daiano)  
su ceppi di *Fagus sylvatica*; N F  
ex. n. 230 X
- *P. tigrinus* (Bull. ex Fr.) Sing.  
Rovereto, città - Lavini;  
su radici di latifoglie; N F  
ex. n. 41

GENUS: *Lentinus* Fr.

- *L. fulvidus* (Bres.) Pil.  
Rovereto, Lavini;  
su palo delle viti; R
- *L. lepideus* (Fr.) Fr.  
Isera, Bordala; Villalagarina, Cei;  
su ceppi di *Larix decidua*; N F

FAMILIA: Schizophyllaceae

- GENUS: *Schizophyllum* Fr.
- *Sch. commune* Fr. ex Fr.  
su legno morto di latifoglie; D D; C  
ex. n. 68

ORDO: Boletales Gilb.

FAMILIA: Strobilomycetaceae Gilb.

- GENUS: *Strobilomyces* Berk.
- *St. floccopus* (Vahl. in Fl. Dam ex Fr.) Karst.  
Villalagarina, Cei;  
bosco misto; N F

GENUS: *Porphyrellus* Gilb.

- *P. porphyrosporus* (Fr.) Gilb.  
Villalagarina, Cei;  
bosco misto; N F

FAMILIA: Boletaceae Chev.

GENUS: *Gyroporus* Quél.

- *G. castaneus* (Bull. ex Fr.) Quél.  
Villalagarina, Cei (Costole); N F
- *G. cyanescens* (Bull. ex Fr.) Quél.  
Brentonico, Polsa;  
in prossimità di *Fagus sylvatica*; N F  
ex. n. 132

GENUS: *Gyrodon* Opat.

- *G. lividus* (Bull. ex Fr.) Sacc.  
Villalagarina, Cei (Canè);  
sotto *Alnus* sp.; R

GENUS: *Boletinus* Kalchbr.

- *B. cavipes* (Opat.) Kalchbr.  
sotto *Larix decidua*; D; F
- *B. cavipes* f. *aurea* (Roll.) Sing.  
sotto *Larix decidua*; D; N F

GENUS: *Suillus* Micheli ex S.F. Gray

- *S. aeruginascens* (Secr.) Snell  
sotto *Larix decidua*; D; F
- *S. aeruginascens* var. *bresadolae* (Quél. in Bres.) Mos.  
Isera, Bordala;  
zona umida sotto *Larix decidua*; N F
- *S. bovinus* (L. ex Fr.) O. Kuntze  
Isera, Lenzima (Faè); Villalagarina, Cei (Costole);  
sotto *Pinus* sp.; N. F.
- *S. collinitus* (Fr.) O. Kuntze  
Rovereto, Vallunga;  
sotto *Pinus* sp.; N F
- *S. flavidus* (Fr.) Sing.  
Trambileno, Pasubio (Cheserle);  
sotto *Pinus mugo*; R
- *S. granulatus* (L. ex Fr.) O. Kuntze  
sotto *Pinus* sp.; D; F  
ex. n. 179
- *S. grevillei* (Klotzsch) Sig.  
sotto *Larix decidua*; D; C
- *S. luteus* (L. ex Fr.) S.F. Gray  
Rovereto, Val Scodella; Brentonico, Polsa;  
sotto *Pinus* sp.; F

- *S. placidus* (Bon) Sing.  
Villalagarina, Cei;  
unica stazione, sotto *Pinus strobus*; R
- *S. sibiricus* Sing.  
Villalagarina, Cei (Daiano);  
sotto *Pinus strobus*; R  
ex. n. 6
- *S. tridentinus* (Bres.) Sing.  
Villalagarina, Cimàna; Isera, Bordala;  
sotto *Larix decidua*; N F
- *S. variegatus* (Sw. ex Fr.) O. Kuntze  
Isera, Lenzima (Faé);  
sotto *Pinus* sp.; N F

GENUS: *Phylloporus* Quél.

- *Ph. rhodoxanthus* (Schw.) Bres.  
Villalagarina, Cei (Costole);  
margine stradale; R

GENUS: *Xerocomus* Quél.

- *X. armeniacus* (Quél.) Quél.  
Rovereto, Vallunga; Rovereto, giardini pubblici; N F
- *X. chrysenteron* (Bull. ex St. Amans) Quél.  
Rovereto, Monte Zugna;  
sotto *Picea abies*; N F
- *X. parasiticus* (Bull. ex Fr.) Quél.  
Rovereto, Vallunga;  
su *Scleroderma* sp.; R
- *X. rubellus* (Krbh.) Quél.  
Rovereto, giardini pubblici; N F
- *S. spadiceus* (Fr.) Quél.  
Brentonico, Polsa; Isera, Bordala;  
margine stradale; N F
- *S. subtomentosus* (L. ex Fr.) Quél.  
Isera, Bordala;  
bosco di *Pinus* sp.; N F

GENUS: *Chalciporus* Bat.

- *Ch. piperatus* (Bull. ex Fr.) Bat.  
sopra gli 800 m; D; N F

GENUS: *Pulveroboletus* Murr.

- *P. cramesinus* (Secr.) Sing.  
Rovereto, Vallunga;  
bosco misto; R
  
- GENUS: *Boletus* Dill. ex Fr.
- *B. aereus* Bull. ex Fr.  
Rovereto, Vallunga;  
bosco di misto con prevalenza di *Quercus* sp.; N F
- *B. aestivalis* Paulet ex Fr.  
D; F
- *B. appendiculatus* Schff. ex Fr.  
Rovereto, Val Scodella;  
bosco misto; R
- *B. calopus* Fr.  
sopra gli 800 m; D; F
- *B. caucasicus* Sing.  
Rovereto, Moietto;  
bosco misto; N F
- *B. dupainii* Boud.  
Villalagarina, Nasupel;  
bosco misto; R
- *B. edulis* Bull. ex Fr.  
D; C
- *B. erythropus* Fr. ex Pers.  
Villalagarina, Cei (Bellaria); Isera, Bordala;  
sotto *Picea abies*; N F
- *B. fechtneri* Vel.  
Villalagarina, Cei (Pra dell'albi)  
sotto latifoglie; N F
- *B. impolitus* Fr.  
Vallarsa, Albaredo;  
bosco misto; R
- *B. lupinus* Krbh.  
Villalagarina, Cei (Daiano);  
sotto *Fagus sylvatica*; R
- *B. luridus* Schff. ex Fr.  
D; F
- *B. pinicola* Vitt.  
Villalagarina, Cei; Isera, Bordala; F
- *B. queletii* Schulz.  
Villalagarina, Cei - Nasupel;  
bosco di latifoglie; N F

- *B. radicans* Pers. ex Fr.  
Villalagarina, Cei (Daiano);  
sotto *Fagus sylvatica*; R
- *B. regius* Krbh.  
Villalagarina, Cei (Bellaria);  
bosco di *Fagus sylvatica* e *Quercus* sp.; R
- *B. rhodopurpureus* Smotl.  
Villalagarina, Cei;  
sotto *Fagus sylvatica*; R
- *B. rhodoxanthus* (Krbh.) Krbh.  
Vallarsa, Albaredo;  
sotto latifoglie; N F
- *B. satanas* Lenz.  
Mori, Besagno; sotto *Castanea sativa*;  
Isera; sotto latifoglia;  
Villalagarina, Cei (le Mandre); bosco misto; N F
- *B. speciosus* Frost.  
Villalagarina, Cei;  
bosco misto; R
- *B. splendidus* Martin ssp. *splendidus*  
Villalagarina, Cei (Fornasetta); R

GENUS: *Leccinum* S.F. Gray

- *L. aurantiacum* (Bull. ex St. Amans) S.F. Gray  
sotto *Populus tremula*; D; C
- *L. crocipodium* (Let.) Walt.  
Villalagarina, Cei (Trasiel);  
sotto latifoglie; R
- *L. duriusculum* (Kalchbr. & Schulz. ap. Fr.) Sing.  
Brentonico, Polsa (Zestarei);  
sotto *Populus tremula*; R
- *L. griseum* (Quél.) Sing.  
sotto diverse latifoglie; D; C
- *L. holopus* (Rostk) Watl.  
Brentonico, Polsa (Zestarei); R
- *L. oxydabile* (Sing.) Sing.  
Brentonico, Polsa;  
sotto *Populus tremula*; R
- *L. quercinum* (Pil.) Pil.  
Rovereto, Vallunga;  
bosco misto; N F
- *L. scabrum* (Bull. ex Fr.) S.F. Gray  
sotto *Betula* sp.; D; F

- *L. testaceo scabrum* (Secr.) Sing.  
Villalagarina, Cei (Bellaria); Brentonico, Polsa;  
sotto *Betula* sp.; N F
- *L. vulpinum* Watl.  
Ronzo-Chienis, Bordala Alta;  
sotto *Pinus* sp.; N F
- *L. vulpinum f. piceinum* (Watl.) Pil.  
Ronzo-Chienis, Monte Biaena;  
sotto *Picea abies*; N F

FAMILIA: Paxillaceae Mre. ap. Mre. Dumée e Lutz

GENUS: *Paxillus* Fr.

- *P. atromentosus* (Batsch) Fr.  
D; N F
- *P. filamentosus* Fr.  
sotto *Alnus* sp.; D; N F
- *P. involutus* (Batsch) Fr.  
D; N F
- *P. panuoides* Fr.  
Villalagarina, Cei;  
su legno in una cantina; R

GENUS: *Hygrophoropsis* (Schroet. in Cohn.) R. Mre.

- *H. aurantiaca* (Wulf. ex Fr.) R. Mre.  
Brentonico, Polsa;  
su ceppo marcescente; N F
- *H. morganii* (Pek.) Bigelow  
Villalagarina, Cei; R

GENUS: *Omphalotus* Fay.

- *O. olearius* (DC ex Fr.) Sing.  
Rovereto, Vallunga;  
alla base di pianta di *Quercus* sp.; N F

FAMILIA: Gomphidiaceae R. Mre.

GENUS: *Gomphidius* Fr. Gonfidio

- *G. glutinosus* (Schff.) Fr.  
sopra gli 800 m: D; F

- *G. gracilis* Berk. & Br. ss. Bres.  
Isera, Bordala; Villalagarina, Cei;  
sotto *Larix decidua*; N F
- *G. maculatus* (Scop.) Fr.  
sotto *Larix decidua* in montagna;  
D; N F
- *G. roseus* (L.) Fr.  
Rovereto, Val Scodella;  
sotto *Pinus* sp.; N F

GENUS: *Gyrocyathus* (Sing.) O.K. Miller

- *Chr. helveticus* (Sing.) Mos.  
Villalagarina, Cei; Isera, Bordala;  
sotto *Picea abies*; N F
- *Chr. rutilus* (Schff. ex Fr.) O.K. Miller  
D; C

#### BIBLIOGRAFIA

- BLUM J., 1962 - Les russules, *Paul Lechevalier*, Paris, 227 pp.
- BOUDIER E., 1905-1910 - Icones micologicae *Librairie des Sciences Naturelle (Paul Klincksied-Leon Lhomme successeur)*, Paris, 1/4: 350, 600 figg.
- BOURDOT H. e GALZIN A., 1928 - Hymenomycetes de France, *Maerel Bry*, Sceaux, 764 pp.
- BRESADOLA G., 1933 - Iconographia mycologica, *Soc. Bot. It.*, Milano, 1/26: 148, 1246 figg.
- CAPPELLI A., 1984 - Agaricus, *Libreria Editrice Biella Giovanna*, Saronno, 560 pp., 70 figg.
- CETTO B., 1970-1973 - I funghi dal vero, *Saturnia*, Trento, 1/4: 2739, 1693 figg.
- COBELLI R., 1881 - Elenco dei funghi della Valle Lagarina, *Michelia*, 8: 227, 240 figg.
- COBELLI R., 1885 - Elenco sistematico degli Imeno-Disco-Gasteromiceti e Tuberacei finora trovati nella Valle Lagarina, *Tipografia Roveretana*, Rovereto, 23 pp.
- COBELLI R., 1891 - Contribuzione alla flora micologica della Valle Lagarina, *Verb. Zool. Bot. Ges.*, 41: 581, 584 figg.
- CORNER E.J.H., 1983 - Ad polyporaceas, *Cramer*, Vaduz, 1: 184, 31 figg.
- DALLA TORRE K.W. e SARNTHEIN L.G., 1900 - «Die Litteratur der Flor von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein» Wagner'schen Universitäts - Buchhandlung. Innsbruck.
- DALLA TORRE K.W. e SARNTHEIN L.G., 1905 - «Die Pilze (Fungi) von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein» Wagner'schen Universitäts - Buchhandlung. Innsbruck.
- DEMOULIN V., 1969 - Les gasteromycetes, *Les Naturalistes Belges*, Bruxelles, 59 pp., 25 figg.

- DENNIS R.W.G., 1981 - British ascomycetes, *Cramer*, Vaduz, 585 pp., 79 figg.
- ESSETTE H., 1964 - Les psalliotes, *Paul Lechevalier*, Paris, 50 pp., 57 figg.
- JAHN H., 1963 - Mittteleuropäische Porlinge und ihr Vorkommen in Westfalen, *J. Cramer*, Germany, 143 pp., 30 figg.
- JAHN H., 1971 - Steroide Pilze in Europa, *Westfälische Pilzbriefe*, Detmold-Heiligenkirchen, 176 pp., 83 figg.
- JÜLICH W., 1984 - Kleine Kryptogamenflora Band II b/1 Die Nichtblätterpilze-Gallerpilze-Bauchpilze, *Gustav Fischer*, Stuttgart, 626 pp., 15 figg.
- KONRAD P. e MAUBLANC A., 1924/1937 - Icones selectae fungorum, *Paul Lechevalier*, Paris, 1/6: 500.
- KÜHNER R. e ROMAGNESI H., 1957 - Flore analytique des champignons supérieurs, *Masson et Cie*, Paris, 556 pp., 677 figg.
- LANGE J.E., 1935 - Flora agaricina danica, Copenhagen, 575 pp., 200 figg.
- LAZZERI G., 1980 - Glossario micologico in cinque lingue, *Gruppo Micologico G. Bresadola*, Trento, 165 pp.
- LECLAIR A. e ESSETTE H., 1969 - Les bolets, *Paul Lechevalier*, Paris, 81 pp., 72 figg.
- MAAS GEESTERANUS R.A., 1975 - Die terrestrischen Stachelpilze Europas, *North Holland*, Amsterdam, *Publishing Company*, London, 167 pp., 40 figg.
- MARCHAND A., 1971-1973 - Champignons du Nord et du Midi, *Société Mycologique des Pyrénées Méditerranéennes*, Perpignan, 1/8: 2236, 800 figg.
- MARTIN G.W. e ALEXOPOULUS C.J., 1969 - The Myxomycetes, *University of Iowa*, 561 pp., 41 figg.
- MERLO ERICA G. e ROSSO M. e TRAVERSO M., 1980 - I boleti, *Sagep Editrice*, Genova, 127 pp., 97 figg.
- MERLO ERICA G. e TRAVERSO M., 1983 - Le amaniti, *Sagep Editrice*, Genova, 151 pp., 132 figg.
- MICHAEL E. e HENNING B., 1968-1970 - Handbuch für Pilzfreunde, *Veb Gustav Fischer*, Jenia, 1: 1778 pp., 1200 figg.
- MOSER M., 1960 - Die gattung Phlegmacium, *Julius Klinkhardt*, Bad Heilbrunn, 447 pp., 32 figg.
- MOSER M., 1963 - Kleine Kryptogamenflora. Band II. Ascomyceten, *Gustav Fischer*, Stuttgart, 146 pp., 7 figg.
- MOSER M., 1978 - Kleine kryptogamenflora. Band II 6/2 Die Röhrlinge und blätterpilze, *Gustav Fischer*, Stuttgart, 532 pp., 13 figg.
- NEÜHOFF W., 1956 - Die milchinge (lactarii), *Verlag julius Klinkhardt*, Bad Heilbrunn Abb., 248 pp., 20 figg.
- OVERHOLTS L.O., 1953 - The polyporaceae of the United States, Alaska and Canada, *Ann Arbor the University of Michigan Press*, 466 pp., 132 figg.
- RICKEN A., 1915 - Die Blätterpilze (Agaricaceae), *Theodor Oswald Weigel*, Lipsia, 413 pp., 112 figg.
- ROMAGNESI H., 1967 - Les russules d'Europe et d'Afrique du Nord, *Editions Bordas*, France, 998 pp., 1129 figg.
- UNIONE SVIZZERA DELLE SOCIETÀ MICOLOGICHE, 1967-1975 - *Tavole svizzere di funghi*, Aarau, 1/5: 349 figg.

#### RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano tutti i soci del Gruppo Micologico «G. Barbacovi» che hanno aiutato il lavoro di raccolta delle informazioni necessarie a stilare questo elenco. Gli autori sono, inoltre, in debito di riconoscenza verso il Museo Civico e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, hanno contribuito alla riuscita della pubblicazione.

---

#### Indirizzi degli autori:

- Marisa G., Merighi D.: c/o Gruppo Micologico e protezione flora «G. Barbacovi»  
Piazza Follone, 39 - 38068 Rovereto.
- Posanti F.: c/o Sezione Archeologia, Storia e Scienze Naturali dei Musei Civici di Rovereto  
Via Calcinari, 18 - 38068 Rovereto.
-